



(luspatercept-aamt)
for injection 25mg • 75mg

Conversando con su médico sobre REBLOZYL

Un recurso que le ayudará a lo largo de su
tratamiento con REBLOZYL



Usted y su equipo de profesionales de la salud van juntos a lo largo de este tratamiento. Mantener las líneas de comunicación abiertas puede ayudar a su equipo de profesionales de la salud a entender mejor cómo se está sintiendo. Para ayudarle, esta guía incluye datos para iniciar una conversación y preguntas que puede hacerle a su médico durante su tratamiento con REBLOZYL. Complete esta guía para ayudarle a estar preparado antes de su próxima visita.

Para comenzar, seleccione una opción a continuación que mejor le aplique:

ESTÁ CONSIDERANDO REBLOZYL >

ESTÁ COMENZANDO REBLOZYL >

ESTÁ RECIBIENDO REBLOZYL >

¿Qué es REBLOZYL?



REBLOZYL es un medicamento inyectable recetado, y se usa para tratar la anemia (recuento bajo de glóbulos rojos) en adultos con:

MDS, por sus siglas en inglés, que pueden necesitar transfusiones de glóbulos rojos (RBC, por sus siglas en inglés) con regularidad y nunca han recibido otro tipo de medicamento conocido como un agente estimulante de la eritropoyesis (ESA, por sus siglas en inglés).

MDS: síndrome mielodisplásicos

MDS-RS o MDS/MPN-RS-T que necesitan 2 o más unidades de RBC en 8 semanas y no han respondido bien a un ESA.

MDS-RS: síndrome mielodisplásicos con anílido sideroblastos

MDS/MPN-RS-T: neoplasias o mieloproliferativas con anílido sideroblastos y trombocitosis

✗ REBLOZYL no es un sustituto para las transfusiones de RBC en personas que necesitan tratamiento inmediato para la anemia.

✗ Se desconoce si REBLOZYL es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

¿Qué debo discutir con mi equipo de profesionales de la salud antes de comenzar el tratamiento?



Hable con su equipo de profesionales de la salud sobre todos sus problemas de salud y factores de riesgo, incluido si:

- tiene o ha tenido coágulos sanguíneos
- usa terapia de reemplazo hormonal o píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales)
- se ha sometido a una extirpación del bazo (esplenectomía)
- fuma
- tiene o ha tenido presión arterial alta (hipertensión)

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa e Información para el Paciente de REBLOZYL.

Está considerando REBLOZYL

Al elegir un tratamiento para ayudar a manejar su anemia relacionada con MDS, es importante hablar de forma abierta con su equipo de profesionales de la salud. Si está considerando recibir tratamiento, pregúntele a su equipo de profesionales de la salud qué debe esperar al iniciar REBLOZYL. Recuerde, usted y sus cuidadores son su mejor apoyo.

Para ayudarle a recordar toda la información que desea compartir con su equipo de profesionales de la salud, considere contestar las preguntas 1 a la 4 antes de su próxima visita y usar las preguntas 5 a la 8 durante la conversación.

1. Mis tratamientos actuales y pasados, incluidas las transfusiones de glóbulos rojos (si aplica):

5. ¿Pudiera REBLOZYL ser adecuado para mí? ¿Cómo es este distinto de otros tratamientos?

2. Mi objetivo(s) de tratamiento actual:

Ejemplos de objetivos de tratamiento pudieran ser no necesitar transfusiones o elevar los niveles de hemoglobina.

6. ¿Cómo pudiera REBLOZYL ayudarme a lograr mis objetivos de tratamiento?

3. La anemia afecta estas partes de mi vida diaria:

7. ¿Qué debo esperar mientras recibo REBLOZYL? ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles?

4. Los síntomas que estoy presentando ahora:

Problemas de memoria o pensamiento	Palidez o color amarillento de la piel
Cansancio	Dolores de cabeza
Debilidad	Falta de aliento
Mareo	Calambres musculares y dolor en los huesos
Escalofríos	Otro:
Aturdimiento	

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa e Información para el Paciente de REBLOZYL.

Reblozyl®
(luspatercept-aamt)
for injection 25mg • 75mg

Está comenzando REBLOZYL

Tal vez se pregunta qué debe esperar al comenzar el tratamiento de REBLOZYL para la anemia relacionada con MDS. Las siguientes son algunas preguntas que puede hacer antes de comenzar, que pudieran ayudarle a sentirse más preparado:

1. ¿Cómo recibiré REBLOZYL?

2. ¿Con qué frecuencia recibiré mi dosis de REBLOZYL?

3. ¿Cuáles son los efectos secundarios y cómo pudiera sentirme a lo largo del tratamiento?

4. ¿Cómo pudiera mi dosis de REBLOZYL cambiar con el tiempo?

5. ¿Cuál debe ser mi objetivo(s) mientras recibo tratamiento con REBLOZYL?

6. ¿A qué debo darle seguimiento y de qué debo hablar con mi médico en cada cita?

“

Me siento tan agradecida de mi equipo médico. Comparto abiertamente mis sentimientos, ya sean buenos, malos o indiferentes. Hablamos sobre mis valores y qué efecto están teniendo en mi cuerpo, lo que me ayudan a sentirme cómoda al tomar mi decisión.

”

Donna, Paciente que recibe REBLOZYL

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa e Información para el Paciente de REBLOZYL.

Reblozyl®
(luspatercept-aamt)
for injection 25mg • 75mg

Está recibiendo REBLOZYL

Es importante hablar sobre las cosas qué ha estado dándole seguimiento, como se está sintiendo y si está cumpliendo los objetivos del tratamiento con su médico en cada visita. **Hacer preguntas a lo largo del tratamiento de REBLOZYL pudiera hacerle sentir más cómodo sobre su decisión de mantenerse recibiendo tratamiento para su anemia relacionada con MDS.**

1. Tomando en cuenta cómo estoy respondiendo a REBLOZYL, ¿está funcionándome mi dosis actual?

2. ¿A qué debo estar pendiente y darle seguimiento desde ahora hasta mi próxima cita?

3. ¿Aún estoy logrando mis objetivos de tratamiento? ¿Necesitaré ajustarlos con el tiempo?

Ejemplos de objetivos de tratamiento pudieran ser no tener que recibir transfusiones o elevar los valores de hemoglobina.



Los cambios en su dosis a lo largo del tiempo están basados en sus necesidades particulares.

Tanto en los estudios de REBLOZYL de primera como de segunda línea, muchas personas necesitaron al menos un ajuste de dosis.

[DESCARGUE EL REGISTRO DE SEGUIMIENTO
DE TRATAMIENTO DE REBLOZYL](#) ↓

“

Me siento agradecida de haber respondido a REBLOZYL. A pesar de que me va bien con el tratamiento, aún me surgen preguntas. Conozco la importancia de comunicarme con mi equipo médico pues me apoyan a lo largo de mi tratamiento.

”

Donna, Paciente que recibe REBLOZYL

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa e Información para el Paciente de REBLOZYL.

Reblozyl®
(luspatercept-aamt)
for injection 25mg • 75mg

Datos importantes sobre REBLOZYL® (luspatercept-aamt)

El siguiente es un resumen de la información importante que debe conocer sobre REBLOZYL. Su equipo de profesionales de la salud puede ayudarle a responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre este medicamento. **Guarde esta información en un lugar seguro para que pueda hacer referencia a esta antes y durante su tratamiento.**

Esté atento a los siguientes iconos según vaya leyendo:



Hable con su equipo de profesionales de la salud



Llame a un profesional de la salud de inmediato



Información útil para recordar

¿Qué es REBLOZYL?

 REBLOZYL es un medicamento inyectable recetado, y se usa para tratar la anemia (recuento bajo de glóbulos rojos) en adultos con:

MDS que pueden necesitar transfusiones de glóbulos rojos (RBC, por sus siglas en inglés) con regularidad y nunca han recibido otro tipo de medicamento conocido como un agente estimulante de la eritropoyesis (ESA, por sus siglas en inglés).

MDS: síndromes mielodisplásicos

MDS-RS o MDS/MPN-RS-T que necesitan 2 o más unidades de RBC en 8 semanas y no han respondido bien a un ESA.

MDS-RS: síndromes mielodisplásicos con anillo sideroblasto

MDS/MPN-RS-T: neoplasias mielodisplásicas o mieloproliferativas con anillo sideroblasto y trombocitosis

 REBLOZYL no es un sustituto para las transfusiones de RBC en personas que necesitan tratamiento inmediato para la anemia.

 Se desconoce si REBLOZYL es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

¿Qué debo discutir con mi equipo de profesionales de la salud antes de comenzar el tratamiento?

 **Hable con su equipo de profesionales de la salud sobre todos sus problemas de salud y factores de riesgo,** incluido si:

- tiene o ha tenido coágulos sanguíneos
- usa terapia de reemplazo hormonal o píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales)
- se ha sometido a una extirpación del bazo (esplenectomía)
- fuma
- tiene o ha tenido presión arterial alta (hipertensión)

 **Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa,** incluidos:

- medicamentos recetados • medicamentos sin receta • vitaminas • suplementos a base de hierbas

Estos no son todos los temas de los que debe hablar con su equipo de profesionales de la salud. Pregúntele a su equipo de profesionales de la salud sobre cualquier cosa de la que no esté seguro antes de comenzar el tratamiento.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa e Información para el Paciente de REBLOZYL.

Reblozyl®
(luspatercept-aamt)
for injection 25mg • 75mg

¿De qué debo hablar con mi equipo de profesionales de la salud respecto al embarazo, el control del embarazo y la lactancia?

 **Hable con su equipo de profesionales de la salud** si:



Está embarazada o tiene planes de estarlo—REBLOZYL puede causar daño al feto.

Si tiene la capacidad para quedar embarazada, su equipo de profesionales de la salud debe hacerle una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir REBLOZYL. Debe usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y por al menos 3 meses después de su última dosis de REBLOZYL. Hable con su equipo de profesionales de la salud sobre los anticonceptivos que puede usar con REBLOZYL.



Llame a su profesional de la salud de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con REBLOZYL.

REBLOZYL puede afectar su capacidad para quedar embarazada. Hable con su equipo de profesionales de la salud si los problemas de fertilidad le causan preocupación.



Está lactando o tiene planes de hacerlo

No debe lactar durante el tratamiento ni por 3 meses después de su última dosis de REBLOZYL. Se desconoce si REBLOZYL pasa a la leche materna. Hable con su equipo de profesionales de la salud sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante este tiempo.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves de REBLOZYL?

Un **efecto secundario grave** es un efecto secundario que a veces puede atentar contra la vida y provocar la muerte. Estos pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento o incluso hasta después de haber terminado el tratamiento. Pudiera presentar más de un efecto secundario a la misma vez.

Coágulos de sangre (trombosis/tromboembolismo) — Durante el tratamiento con REBLOZYL, han ocurrido coágulos sanguíneos en las arterias, venas, cerebro y pulmones en personas con betatalasemia. El riesgo de coágulos sanguíneos puede ser mayor en personas que se han sometido a una extirpación del bazo o que usan terapia de reemplazo hormonal o píldoras anticonceptivas.



Llame a su profesional de la salud o busque ayuda médica de inmediato si presenta cualquiera de estos síntomas:

- dolor de pecho
- dificultad para respirar o falta de aliento
- dolor en la pierna, con o sin hinchazón
- sensación de frío o palidez en los brazos o piernas
- sensación repentina de entumecimiento o debilidad de corta duración o que continúa ocurriendo por un periodo prolongado, en especial en un lado del cuerpo
- dolor de cabeza intenso o confusión
- problemas repentinos de la visión, el habla o el equilibrio (como dificultad para hablar, caminar o mareos)

Presión arterial alta (hipertensión) — REBLOZYL puede aumentar su presión arterial. Su profesional de la salud verificará la presión arterial antes de recibir su dosis de REBLOZYL. Puede que su profesional de la salud le recete un medicamento para tratar la presión arterial alta o aumente la dosis del medicamento que toma para tratar la presión arterial alta, si desarrolla presión arterial alta durante el tratamiento con REBLOZYL.

Consulte la Información de Seguridad Importante a lo largo de este folleto y la **Información de Prescripción** completa e **Información para el Paciente** de REBLOZYL.

Reblozyl®
(luspatercept-aamt)
for injection 25mg • 75mg

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de REBLOZYL?

Los efectos secundarios más comunes de REBLOZYL incluyen:

- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor de espalda, en las articulaciones, músculos o huesos
- dolor en las articulaciones
- mareos
- náuseas
- diarrea
- tos
- dolor de estómago (abdominal)
- dificultad para respirar
- hinchazón de las manos, piernas o pies
- presión arterial alta
- reacciones alérgicas

Estos no son todos los efectos secundarios posibles.



Hable con su equipo de profesionales de la salud para obtener más información sobre los efectos secundarios. Se le exhorta a notificar los efectos secundarios a la FDA en www.fda.gov/medwatch o llamando al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo recibiré REBLOZYL?



REBLOZYL administra vía inyección subcutánea (debajo de la piel) en la parte superior del brazo, en el muslo o abdomen por un profesional de la salud. La dosis inicial recomendada de REBLOZYL es 1 mg/kg, una vez cada 3 semanas. Usted junto con su equipo de profesionales de la salud deben determinar el plan de tratamiento adecuado para usted.

REBLOZYL es un tipo de medicamento conocido como un agente de maduración eritroide (EMA, por sus siglas en inglés), y está disponible en viales de dosis única que deben prepararse y ser inyectados por un profesional de la salud.

Ingredientes activos: luspatercept-aamt

Ingredientes inactivos: ácido cítrico monohidratado, polisorbato 80, sacarosa y citrato trisódico dihidratado



Antes de cada inyección de REBLOZYL, su profesional de la salud llevará a cabo pruebas para verificar su hemoglobina, revisar su historial de transfusiones y conocer cómo su anemia está respondiendo a REBLOZYL. Su profesional de la salud pudiera ajustar la dosis o suspender el tratamiento dependiendo de cómo usted responde a REBLOZYL.

¿Qué sucede si se retrasa o se omite una dosis?

 **Llame a su profesional de la salud lo antes posible** para volver a coordinar su próxima cita si se retrasó o se omitió una dosis. Su profesional de la salud le administrará la dosis de REBLOZYL lo antes posible. Su tratamiento con REBLOZYL continuará según indicado, con al menos 3 semanas entre cada dosis..



Para más información, consulte la [Información de Prescripción completa](#) y la [Guía del Medicamento](#) adjunto para REBLOZYL. Hable con su equipo de profesionales de la salud para obtener más información sobre este medicamento.

Notas

Use el siguiente espacio para anotar cualquier otro pensamiento o información.



REBLOZYL® es una marca comercial de Celgene Corporation, una compañía de Bristol Myers Squibb.

REBLOZYL® tiene licencia de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EE. UU. y sus afiliadas.

© 2024 Bristol-Myers Squibb Company.

2007-PR-2400025 12/24

